

MAXLAC ws

BẢO VỆ GAN TỤY VÀ ĐƯỜNG RUỘT


✓ ĐƯỜNG RUỘT KHỎE MẠNH ✓ NĂNG SUẤT TỐI ĐA

Chế phẩm sinh học bổ sung 2 dòng lợi khuẩn:

Enterococcus Faecium (DSM 7133)

và *Lactobacillus rahnosus* (DSM 7134) cho tôm

và các loài vật nuôi khác.



LACTOSAN

Nhà sản xuất: Lactosan - Áo
Add: An der Mühlenau 4, 25421 Pinneberg Germany
Tel: +49(0)41012186200 | Fax: +49(0)41012156219
Email: info@provita-supplements.de
Web: www.provita-supplements.de

Thai Hoa

Your Desire - Our Inspiration

CÔNG TY TNHH THÁI HÒA HTQ
Add: 130/10/12 đường Tên Lửa, Khu phố 8,
Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 097.787.0974
Email: thaihoahqinfo@gmail.com

MAXLAC ws

THÔNG TIN SẢN PHẨM MAXLAC ws


CÔNG DỤNG	LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên ức chế nhóm vi khuẩn <i>V. Parahaemolyticus</i> gây bệnh EMS và <i>V. Alginolyticus</i> phân trắng trên tôm. - Hiệu quả áp khuẩn gây bệnh cao khi tạt trực tiếp ra ngoài môi trường ao (Ương, Nuôi), khi mật độ khuẩn gây hại <i>Vibrio sp</i> cao trên 10^3 cfu/ml. - Khi mật độ khuẩn gây hại <i>Vibrio sp</i> cao trên 10^5 cfu/ml. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trộn 1-2gr sản phẩm/1kg thức ăn, Trộn 1-2 củ/ngày, trộn liên tục suốt vụ nuôi. - Liều tạt: Dùng 100-150 gr sản phẩm/1000 m³, để ức chế khuẩn <i>Vibrio sp</i> ngoài môi trường, định kỳ sử dụng 5-7 ngày/lần. Nên tạt vào ban ngày. - Liều tạt: Dùng 200 gr sản phẩm/1000 m³ để ức chế khuẩn <i>Vibrio sp</i> ngoài môi trường, liên tục 2 ngày. Nên tạt vào ban ngày.

KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN TÔM

TÔM CÓ BIỂU HIỆN NHIỄM KHUẨN



Mật độ *Vibrio* trong tôm bệnh khi dùng sản phẩm.



ỨNG DỤNG THỰC TẾ - SỬ DỤNG MAXLAC ws

